


Podstawą w bioasekuracji, czyli ochrony zdrowia trzody chlewnej przed drobnoustrojami chorobotwórczymi jest dbanie o czystość w chlewni na każdym etapie produkcji.

Wszystkie pomieszczenia należy:

- myć gorącą wodą przy użyciu myjek wysokociśnieniowych,
- dokładnie suszyć (inaczej wiele preparatów dezynfekujących ma upośledzone działanie),
- dezynfekować preparatami o szerokim spektrum działania (wiruso-, bakterio- i grzybobójczymi) zgodnie z zaleceniami producentów.

! Pamiętaj!

- zasada całe pomieszczeni pełne – całe pomieszczenie puste,
- dokładne mycie i dezynfekcja pomieszczeń środkami o szerokim spektrum działania,
- dezynfekcja wjeżdżających na teren gospodarstwa pojazdów,
- ewidencja wizytacji chlewni,
- odzież fermowa lub jednorazowa,
- maty dezynfekcyjne,
- ochrona przed gryzoniami – deratyzacja,
- kwarantanna nowo zakupionych świń.



Prof. Pejsak: Nowe ognisko ASF to efekt lekceważenia zasad bioasekuracji

Główną przyczyną wystąpienia nowego ogniska ASF u świń jest lekceważenie podstawowych zasad bioasekuracji – mówi w rozmowie z naszym portalem prof. Zygmunt Pejsak

Nie opadają emocje po wykryciu nowego ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu hajnowskiego. Przypadek ten jest o tyle wyjątkowy, że dotyczy gospodarstwa utrzymującego blisko 300 świń – przypadki choroby wykrywano dotychczas w niewielkich, ekstensywnych gospodarstwach. Zdaniem profesora Zygmunta Pejsaka z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach główną przyczyną wystąpienia choroby na fermie jest lekceważenie zasad bioasekuracji. Faktem jest, że gospodarstwo położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie pola kukurydzy i lasu, co stwarza dogodne warunki do obecności dzików. Głównym problemem jest jednak lekceważenie podstawowych zasad bioasekuracji. Gospodarstwo, w którym stwierdziliśmy przypadki ASF nie spełniało bowiem wymogów ochrony biologicznej. Nie jest to jednak odosobniony przypadek: w Polsce, nawet w regionie zagrożonym występowaniem ASF nie tylko mali, lecz także więksi producenci świń nagminnie nie przestrzegają zasad bioasekuracji. Bez żadnej wątpliwości stąd bierze się całe nieszczęście. Rolnicy muszą wreszcie zrozumieć, że ten, kto nie przestrzega podstawowych zasad ochrony biologicznej, nie tylko naraża siebie, lecz także stwarza poważny problem dla wszystkich producentów świń w kraju – mówi w rozmowie z naszym portalem profesor Pejsak.

Jego zdaniem nie należy również pokładać winy wyłącznie w sąsiedztwie z Białorusią:

Musimy oddzielić pojęcie ASF występującego u dzików od ASF występującego u świń. Ze względu na dziki przenikające do Polski przez granicę z Białorusią nie wytępiamy całkowicie pomoru u tych zwierząt. Jednak, jeżeli będziemy starannie bioasekurować obiekty, w których utrzymywane są świny, uda nam się uniknąć kolejnych ognisk choroby. A przecież głównym problemem nie jest pomór u dzików tylko u świń – tłumaczy nasz rozmówca.

Jak informuje profesor Pejsak, na chwilę obecną nie wiadomo czy świny ze strefy bezpośrednio przylegającej do gospodarstwa będą likwidowane. Możliwe jest, że uda się tego uniknąć. Obecnie badamy wszystkie zwierzęta z przylegającej strefy na obecność wirusa ASF. Badania będą powtarzane raz w tygodniu przez najbliższy miesiąc. Jeżeli wykonane analizy, dadzą wynik negatywny, a w gospodarstwie będą przestrzegane zasady bioasekuracji, odstępimy od likwidacji stada – tłumaczy nasz rozmówca. Jak informuje profesor Pejsak, w otoczeniu gospodarstwa zostanie ponownie wprowadzona III strefa zagrożenia afrykańskim pomorem świń. Została ona zniesiona 15 marca bieżącego roku.

Zasady Bioasekuracji Fermy

Wirus afrykańskiego pomoru świń nie przenosi się z wiatrem na duże odległości, do rozprzestrzeniania potrzebują „pomocy” przenosiciela tj. w naszym kraju zakażonej świni, dzika lub produktów pochodzących od zakażonych zwierząt. Niebagatelną rolę w tym łańcuchu odgrywa też człowiek. Stosuj zasady bioasekuracji w odniesieniu do zwierząt, ludzi, środków transportu, budynków i wyposażenia fermy oraz produktów pochodzenia zwierzęcego

PAMIĘTAJ ŻE !!!

- 1 Teren fermy- każdego gospodarstwa powinien być zabezpieczony szczelnym ogrodzeniem zabezpieczającym przed przedostaniem się na teren fermy osób postronnych oraz dzikich zwierząt. Bramy wjazdowe i furtki wejściowe muszą pozostawać zamknięte. Należy do maximum ograniczyć wizyty na fermach osób trzecich. Jeśli już jest to konieczne, to bezwzględnie należy pamiętać o stosowaniu odzieży ochronnej.
- 2 W bramach i furtkach należy umieścić maty dezynfekcyjne nasączone środkiem dezynfekcyjnym.
- 3 zabezpieczyć na fermie odpowiednią ilość środka dezynfekcyjnego służącego do bieżącego sporządzania roztworów.
- 4 Bezwzględnie ograniczyć ruch samochodów w gospodarstwie, jeśli to konieczne należy wpuszczać na teren samochody uprzednio dokładnie oczyszczone i zdezynfekowane
- 5 Należy pamiętać aby ograniczyć do minimum zakup nowych świń - szczególnie nieudokumentowanego pochodzenia a jeśli już doszło do zakupu to zastosować kwarantannę do nowych osobników
- 6 Pamiętaj o przeprowadzaniu bieżącej i okresowej dezynfekcji na fermie. Dobrze przeprowadzona dezynfekcja musi być poprzedzona najpierw sprzątaniem i myciem a po zakończonej dezynfekcji dokładnym wysuszeniem.
- 7 Należy na bieżąco monitorować obecność gryzoni na fermie
- 8 Ponadto należy pamiętać oraz bezwzględnie przestrzegać, aby w żywieniu zwierząt nie stosować żadnych produktów zwierzęcego pochodzenia (zlewki)
- 9 Również wystrzegać się i nie wprowadzać na teren fermy produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego szczególnie z niewiadomych źródeł
10. Zabezpieczyć okna siatkami przed dostępem ptaków do pomieszczeń hodowlanych.